

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

*Applicazione Regolamento CE 1305/2013*

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Pre chiusura grappolo BBCH 75

Bollettino di difesa della vite n°5 del 25/06/2022

## PERONOSPORA

Le precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, seppur di bassa intensità, hanno causato una prolungata bagnatura fogliare e una umidità relativa nell'aria più alta.

Per proteggere i grappoli e la nuova vegetazione è bene eseguire un trattamento antiperonosporico utilizzando **RAME METALLO** o altro prodotto di copertura.

Si ricorda che i principi attivi METIRAM e DITIANON sono impiegabili limitatamente fino al 30 Giugno.

**ATTENZIONE:** limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

- s.a. Rame per 28 Kg/Ha su 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).
- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2022/2024 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

## OIDIO

Le caratteristiche metereologiche di questi giorni sono estremamente favorevoli allo sviluppo del patogeno, è bene quindi addizionare al trattamento liquido

**ZOLFO BAGNABILE** colloidale alle dosi di etichetta.

Per avere una persistenza maggiore è possibile abbinare alla miscela un prodotto con diverso meccanismo di azione:

Per i vigneti con grappoli più sviluppati è consigliato il p.a. **CYFLUFENAMID**, che legandosi alle cere garantisce una maggiore persistenza.

In alternativa, nei vigneti che non hanno raggiunto tale stadio fenologico, si possono adoperare i p.a. **Spiroxamina** o **Metrafenone**

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Vedi Bollettino dedicato.

*Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.*

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0144 / 322272

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

*Applicazione Regolamento CE 1305/2013*

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di ACQUI TERME.

Fase fenologica: Pre chiusura grappolo BBCH 75

Bollettino di difesa della vite n°5 FD del 25/06/2022

## FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(D.M. del 31/5/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite")

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi, si ricorda l'obbligo di effettuare a fioritura conclusa, il primo trattamento

**tra il 24 GIUGNO e il 29 GIUGNO**

contro il vettore della malattia utilizzando a dosi di etichetta:

**ACETAMIPRID o FLUPYRADIFURONE**

**Note:** il p.a. ACETAMIPRID è impiegabile anche per contrastare l'eventuale presenza del Coleottero *Popillia Japonica*

**Trascorse 48 ore dal trattamento è opportuno eliminare la vegetazione sintomatica per limitare la diffusione dell'infezione**

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare. I trattamenti nelle ore serali sono da preferirsi.

### Rispettare le prescrizioni del PAN

(per approfondimenti vedere D.LGS 150 del 14/08/2012)

**SANZIONI: CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A**

**2.400,00 EURO**

Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio completo della vegetazione sottostante prima del trattamento, in caso di fioriture spontanee, anche per le aziende che aderiscono al Bando PSR Misura 10.1.1-Impegno aggiuntivo dell'inerbimento controllato, evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

**DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).**