

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

CORSO IV NOVEMBRE, 44 – 15100 ALESSANDRIA – TEL. 0131 52086

PROGETTO PILOTA PROVINCIALE ALESSANDRIA

Bollettino di difesa della vite n° 11 del 09.09.2022

TRATTAMENTO DI POST-VENDEMMIA

PER AZIENDE CHE ATTUANO STRATEGIE DI DIFESA INTEGRATA (NO BIOLOGICO)



Trattare

FLAVESCENZA DORATA

Nonostante siano anni che si tenta di contenere la diffusione della malattia attraverso trattamenti indirizzati al controllo del vettore nei periodi che precedono la raccolta, i monitoraggi effettuati evidenziano una presenza di adulti di *Scaphoideus titanus* mediamente più elevata rispetto al passato.

In una tale situazione assume un'importanza sempre maggiore il trattamento effettuato non appena l'uva sia stata raccolta.

Al fine di contrastare l'incremento della popolazione del vettore, anche in vista della prossima annata, si consiglia, man mano che nei singoli vigneti sia terminata la vendemmia, di intervenire con un ulteriore trattamento insetticida.

Dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino derive o inquinamenti ai vigneti adiacenti non ancora vendemmiati.

Seguendo le indicazioni del Settore Fitosanitario Regionale, occorrerà intervenire. Si consiglia di utilizzare uno dei due seguenti principi attivi e formulati commerciali:

Acetamiprid (EPIK SL) nel caso in cui il principio attivo sia stato utilizzato una sola volta nell'arco del 2022

Flupyradifurone (SIVANTO PRIME) nel caso non fosse ancora stato impiegato e siano già stati effettuati i due trattamenti con Acetamiprid

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) eliminare i tralci con sintomi e/o estirpare le piante malate.

Rispettare le prescrizioni del PAN (D. Lgs. 150 del 14/08/2012)